



FISURA DE PALADAR

SUBMUCOSA



BLANDO, VELAR POSTERIOR



TOTAL



CRONOGRAMA IDEAL DE TRATAMIENTO DE UN NIÑO CON FISURA DE PALADAR

| EDAD | MESES | | | | | | | | | | | | AÑOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ESPECIALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIRUGÍA PLÁSTICA | A | | | | | B | | | | | | | C | | | | | | | | | | | | D | | | | |
| ENFERMERÍA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTORRINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GENÉTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONOAUDIOLOGÍA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PSICOLOGÍA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PSICOPEDAGOGÍA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESCUELA DE PADRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUDITORÍA/R. CLÍNICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- A: EVALUACIÓN Y PROGRAMACIÓN, DERIVACIÓN Y CONSULTAS
- B: CIERRE DE PALADAR BLANDO AISLADO
- C: CIERRE DE PALADAR COMPLETO
- D: FARINGOPLASTÍA SI ES NECESARIO

NOTA:
SEGÚN EL CRECIMIENTO, DESARROLLO, DIAGNÓSTICO, TÉCNICA EMPLEADA Y EVOLUCIÓN, PODRÍAN REQUERIRSE INTERVENCIONES ADICIONALES COMO CIERRE DE FÍSTULAS, FARINGOPLASTÍAS, ETC.